

# DAKIN Cooper Stabilisé

## Antiseptique 250 ml

Peau, muqueuses, plaies

Solution pour application locale

Médicament autorisé n° 331452.6

### IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

#### • COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Solution concentrée d'hypochlorite de sodium quantité correspondant à chlore actif : 0,500 g pour 100 ml. Permanganate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, eau purifiée.

#### • FORME PHARMACEUTIQUE :

Solution pour application locale : flacon en polyéthylène de 60 ml, 250 ml, 500 ml.

#### • CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

Antiseptique (D : Dermatologie)

#### • TITULAIRE / EXPLOITANT :

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE  
Place L. Auvert – 77020 Melun Cedex

#### • FABRICANT :

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE - Rue de la Saussaie  
77310 St Fargeau-Ponthierry

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

(indications thérapeutiques)

Ce médicament est un antiseptique local à usage externe.

Ce médicament est préconisé dans :

- l'antisepsie de la peau et des muqueuses,
- l'antisepsie des plaies

### ATTENTION !

- DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

*EN CAS DE DOUTE , IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas avaler. Ne pas utiliser en même temps qu'un autre antiseptique. Attention : risque de décoloration de certaines fibres textiles.

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### • INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques ou de savon est à éviter sans un rinçage soigneux intermédiaire.

*AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.*

**• GROSSESSE - ALLAITEMENT :**  
*D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT  
AU COURS DE LA GROSSESSE OU  
DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉ-  
DECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN  
AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.*

### **COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

**• POSOLOGIE :** Les applications locales  
de **DAKIN COOPER® STABILISÉ** se  
font sans dilution, soit :

- en lavages (ex : lavage des plaies),
- en bains locaux (ex : bains de doigts,  
de pieds, de siège),
- en irrigations,
- en compresses imbibées  
ou en pansements humides.

Renouveler les applications selon les  
besoins.

**• MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :**  
Usage externe.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE  
LA VUE DES ENFANTS.**

### **CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :**

En cas d'ingestion accidentelle, l'anti-  
dote est le bicarbonate de sodium.

**EFFETS NON SOUHAITÉS  
ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES) :**  
*COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE  
MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ  
CERTAINES PERSONNES DES EFFETS  
PLUS OU MOINS GÊNANTS :*

- Possibilité de sensations de brûlures ou  
d'irritation (en cas de plaies importantes ou en  
chirurgie gynécologique) ; ceci est habi-  
tuellement sans conséquence et ne doit en  
général pas faire modifier le traitement.
- Risque d'effet irritatif sous occlusion  
prolongée.

*SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À  
VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON  
SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT  
PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.*

### **CONSERVATION :**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation  
figurant sur le flacon.

### **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :**

À conserver à une température inférieure  
à 30°C.

### **DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :**

Février 2005

