

# Eludril Gé

Solution pour bain de bouche

0,5 ml / 0,5 g pour 100 ml

Chlorhexidine, chlorobutanol

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche ?
3. COMMENT UTILISER ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

## 1. QU'EST-CE QUE ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Il est préconisé comme traitement local d'appoint des affections de la cavité buccale et lors de soins post-opératoires en odonto-stomatologie.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche ?

**N'utilisez jamais ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche dans les cas suivants :**  
L'utilisation de ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité (allergie) à la chlorhexidine, au chlorobutanol ou aux autres constituants de la solution.

### Faites attention avec **ELUDRIL Gé**, solution pour bain de bouche :

- Ne pas mettre le produit au contact des yeux et du nez. Ne pas introduire le produit dans le conduit auditif.
- En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours et/ou de fièvre associée, la conduite à tenir doit être réévaluée.
- Une utilisation prolongée peut exposer à une coloration des dents, obturations et prothèses.
- Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E124) et peut provoquer des réactions allergiques.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

- L'utilisation simultanée ou successive d'autres antiseptiques est à éviter compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation...).
- Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement :

Pendant la grossesse ou l'allaitement, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Liste des excipients à effet notoire :

Rouge cochenille A (E 124).

## 3. COMMENT UTILISER **ELUDRIL Gé**, solution pour bain de bouche ? RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

### Mode d'administration :

- Utilisation locale en bain de bouche.
- La solution doit être diluée avant utilisation.
- **Ne pas avaler.**

### Posologie usuelle :

- 10 à 15 ml de solution 2 fois par jour (à diluer dans le gobelet doseur en complétant jusqu'au trait supérieur avec de l'eau tiède) : effectuer le bain de bouche jusqu'à épuisement du gobelet doseur.
- Si nécessaire, cette posologie peut être portée à 3 fois par jour, sachant que la dose maximale est de 20 ml (à diluer), 3 fois par jour.
- Se brosser les dents avant chaque utilisation et rincer soigneusement la bouche à l'eau avant d'utiliser **ELUDRIL Gé**, solution pour bain de bouche.

### Durée de traitement :

La durée du traitement peut être de 2 semaines dans les inflammations gingivales et les parodontites. La durée de traitement ne pourra être prolongée au delà de 2 semaines que sur avis médical.

**Si vous avez utilisé plus de ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche que prévu ?**  
Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation de cette solution pour bain de bouche. Toutefois, en cas de passage systémique (par voie générale), des manifestations de toxicité neurologique, peuvent apparaître. Elles seraient à traiter en milieu spécialisé.

**Si l'administration d'une dose de ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche a été oubliée :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Risque de sensibilisation à l'un des composants de la solution.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :**

**Que contient ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche ?**

**Les substances actives sont :**

Solution de digluconate de chlorhexidine .....	0,500 ml
Chlorobutanol hémihydraté .....	0,500 g

Pour 100 ml.

Titre alcoolique : 42,8% (v/v)

**Les autres composants sont :** glycérol, éthanol à 96 pour cent, docusate de sodium, lévomenthol, solution alcoolique d'huile essentielle de menthe, eau purifiée, rouge cochenille A (E124).

**Qu'est ce que ELUDRIL Gé, solution pour bain de bouche et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour bain de bouche en flacon de 90 ml.

**Titulaire :**

PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, place Abel-Gance

92100 Boulogne

**Exploitant :**

PIERRE FABRE MEDICAMENT

29, avenue du Sidobre

81100 Castres

**Fabricant :**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Etablissement PROGIPHARM

Rue du Lycée

45500 Gien

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Février 2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Affsantp (France).

**Information médicale : Tél. 0800 95 05 64**



Pierre Fabre



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.