

# HEXA spray®

Biclotymol

Collutoire en flacon pressurisé



**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

- **Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.**
- **Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.**

**Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.**

## **IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**

### **COMPOSITION**

Biclotymol .....750 mg.

Excipients : Alcool benzylique, édétate disodique, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), huile essentielle d'anis reconstituée, glycyrrhizinate d'ammonium, saccharine sodique, cellulose dispersible, lécithine de soja, glycérol, éthanol à 96 %, eau purifiée q.s.p. 30 g. Azote (gaz propulseur).

**FORME PHARMACEUTIQUE :** Collutoire. Flacon pressurisé de 30 g.

**CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :** Antiseptique local.

### **TITULAIRE / EXPLOITANT / FABRICANT**

BOUCHARA-RECORDATI (Laboratoires) - 68 rue Marjolin - 92300 LEVALLOIS-PERRET - FRANCE

### **DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament est indiqué dans le traitement local d'appoint des maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

### **ATTENTION !**

#### **DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans les cas suivants :

- En cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants du collutoire.
- Les collutoires pressurisés sont contre-indiqués chez le nourrisson (risque de laryngospasme).

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### **MISES EN GARDE SPECIALES**

**NE PAS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.**

L'usage prolongé (plus de 5 jours) n'est pas souhaitable, car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge. L'utilisation simultanée ou successive d'antiseptiques est à éviter compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation).

### **PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI**

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : **CONSULTER VOTRE MEDECIN.**

## **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.**

Ce médicament contient du biclotymol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi, posologie).

## **GROSSESSE - ALLAITEMENT**

Grossesse

**Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le biclotymol pendant la grossesse.

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.**

**LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS**

Parahydroxybenzoate de méthyle (E218).

## **COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

**POSOLOGIE : RÉSERVÉ À L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS 30 MOIS.** 2 pulvérisations 3 fois par jour.

**MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :** Voie orale

### **AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION**

**Pour pulvériser, il suffit de faire pivoter la tige de l'embout d'un quart de tour  
PULVÉRISER EN TENANT LE FLACON DEBOUT**



**1**  
**Pivoter**



**2**  
**Appuyer**



**Oui**



**Non**

**DURÉE DU TRAITEMENT :** Le traitement ne dépassera pas 5 jours.

## **EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS**

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :**

Possibilité de manifestations allergiques : œdème des lèvres, urticaire, éruptions cutanées, érythème, œdème de Quincke.

La présence de parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et de lécithine de soja peut être à l'origine de réactions allergiques.

**SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS LA NOTICE.**

## **CONSERVATION**

**NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR**

**PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :** Ne pas exposer à la chaleur.

**DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :** Mai 2008