

DIGEDRYL, comprimé effervescent

Dihydrogénéphosphate de sodium anhydre / sulfate de sodium anhydre

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DIGEDRYL, comprimé effervescent et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIGEDRYL, comprimé effervescent ?
3. Comment prendre DIGEDRYL, comprimé effervescent ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIGEDRYL, comprimé effervescent ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DIGEDRYL, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CHOLAGOGUE-CHOLERETIQUE (A : Appareil digestif et métabolisme)
Ce médicament est préconisé en traitement d'appoint des digestions difficiles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIGEDRYL, comprimé effervescent ?

Ne prenez jamais DIGEDRYL, comprimé effervescent dans le cas suivant :

- Allergie aux substances actives ou à l'un des composants.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

Faites attention avec DIGEDRYL, comprimé effervescent : Précautions d'emploi

- UTILISER AVEC PRECAUTION en cas d'obstruction des voies biliaires ou de grave maladie du foie.
 - En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte de la teneur en sodium (470 mg par comprimé).
 - En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêter le traitement et CONSULTER VOTRE MEDECIN.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.



73



Informations importantes concernant certains composants de DIGEDRYL, comprimé effervescent :
Excipient à effet notoire : sodium.

3. COMMENT PRENDRE DIGEDRYL, comprimé effervescent ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

Dissoudre dans un verre d'eau, 1 comprimé, avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Si vous avez pris plus de DIGEDRYL, comprimé effervescent que vous n'auriez dû :

Un surdosage éventuel pourra se traduire par une aggravation des effets indésirables et notamment une forte diarrhée.

Si vous avez pris plus de DIGEDRYL, comprimé effervescent qu'il ne fallait, consultez votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DIGEDRYL, comprimé effervescent est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- risque de diarrhée à forte dose.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DIGEDRYL, comprimé effervescent ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DIGEDRYL, comprimé effervescent après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient DIGEDRYL, comprimé effervescent ?

Les substances actives sont :

Sulfate de sodium anhydre.....54 mg
Dihydrogénophosphate de sodium anhydre.....132 mg
Pour un comprimé effervescent

Les autres composants sont :

Benzoate de sodium, huile essentielle d'anis, acide tartrique, acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium.
1 comprimé contient 470 mg de sodium.

Qu'est ce que DIGEDRYL, comprimé effervescent et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent ; boîte de 2 tubes de 15 comprimés.

Titulaire

MERCK MEDICATION FAMILIALE SAS - 37, RUE SAINT-ROMAIN - 69379 LYON CEDEX 08

Exploitant

MERCK MEDICATION FAMILIALE - 18 C, BOULEVARD WINSTON CHURCHILL - 21000 DIJON
(SIEGE SOCIAL : 37, RUE SAINT ROMAIN - 69008 LYON)

Fabricant

UNITHER INDUSTRIES - ZONE INDUSTRIELLE LE MALCOURLET - 03800 GANNAT

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 11 octobre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'AFSSAPS (France) www.afssaps.fr



En France métropolitaine, Merck Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Merck Médication Familiale vous demande, en conséquence, de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



L995954