



HUMEX

RHUME

HUMEX 0,04 POUR CENT
Solution pour pulvérisation nasale

COMPOSITION POUR 100 ml DE SOLUTION

POUR PULVERISATION NASALE :

Chlorure de benzalkonium 0,04 g
Excipients : Cinéole (eucalyptol), polysorbate 80, chlorure de sodium, eau purifiée.

FORME PHARMACEUTIQUE :

Solution pour pulvérisation nasale, flacon de 15 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

PREPARATION NASALE ANTISEPTIQUE

(R : Système respiratoire)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT :

Laboratoires URGO
42 rue de Longvic
21300 CHENÔVE - FRANCE

DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué en cas de rhume et de rhino-pharyngite chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 mois.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- en cas d'allergie connue aux antiseptiques de la classe des ammoniums quaternaires,

- chez les enfants ayant eu des convulsions dues à la fièvre ou non (contre-indication liée à la présence d'eucalyptol en tant qu'excipient).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

Cette spécialité contient de l'eucalyptol (dérivé terpénique) en tant qu'excipient, qui peut entraîner, à doses excessives :

- des accidents à type de convulsions, chez le nourrisson et chez l'enfant,
- des pauses respiratoires et des malaises chez le nourrisson.

Respectez les conseils d'utilisation, en particulier :

- ne jamais dépasser les doses recommandées (cf. rubrique POSOLOGIE)
- respecter les durées de traitement préconisées,
- pulvériser ce médicament en tenant le flacon bien vertical, l'embout vers le haut.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dès l'ouverture du conditionnement, et a fortiori dès la première utilisation d'une préparation à usage nasal, une contamination microbienne est possible. A utiliser dans les 15 jours après ouverture. En cas de fièvre, maux de tête importants, douleur de l'oreille ou autres symptômes associés, consultez votre médecin. En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.



HUMEX

RHUME

HUMEX 0,04 POUR CENT
Solution pour pulvérisation nasale

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

SI VOUS ETES ENCEINTE OU SI VOUS ALLAITEZ :

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament. D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE

POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

Dérivés terpéniques. En cas de non respect des doses préconisées :
- risque de convulsions chez l'enfant,
- possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 30 MOIS.

Adulte : 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine 4 à 5 fois par jour.

Enfant de plus de 30 mois : 1 pulvérisation dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

La tête étant en position verticale, introduire dans la narine l'extrémité de l'embout nasal.

Presser les parois du flacon tout en inspirant.

Remarque : Le fonctionnement correct du pulvérisateur exige un remplissage incomplet du flacon.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie nasale.

DUREE DU TRAITEMENT

Le traitement ne devra pas dépasser quelques jours.

QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS DU MEDICAMENT ?

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS, notamment :
- possibilité d'allergie,
- irritation locale,

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

01/2006