

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



• STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement, votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin.

Ce médicament est une spécialité d'Automédication, qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que Strepsils citron sans sucre et dans quel cas est il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Strepsils citron sans sucre ?
3. Comment prendre Strepsils citron sans sucre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Strepsils citron sans sucre ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE STREPSILS CITRON SANS SUCRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Antiseptique local (R : système respiratoire)

Ce médicament contient deux antiseptiques locaux (l'amylnmétacrésol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzylrique).

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE ?

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament en cas d'antécédents d'allergie à l'un des composants de la pastille.

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ chez les enfants de moins de 6 ans.

Prendre des précautions particulières avec STREPSILS CITRON SANS SUCRE :

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

En raison de la présence de maltitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire).

Mal de gorge :

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours :

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

L'apport calorique par pastille est de 5,6 kilocalories.

Ce médicament contient de l'amylnmétacrésol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzylrique.

D'autres médicaments en contiennent : ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration)

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse Allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Informations importantes concernant certains composants de STREPSILS citron sans sucre, pastille

Liste des excipients à effet notoire : maltitol, jaune de quinoléine (E104)

3. COMMENT UTILISER STREPSILS CITRON SANS SUCRE ?

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moins de 6 ans.

Posologie

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 3 à 6 pastilles par jour, à sucer lentement sans croquer.

Fréquence d'administration

ESPACÉZ LES PRISES D'AU MOINS 1 HEURE. Prendre les pastilles à distance des repas.

Mode d'administration

Voie buccale.

Pour obtenir un contact prolongé avec les muqueuses, sucer lentement les pastilles.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT, ET EN PARTICULIER CEUX QUI NE SERAIENT PAS MENTIONNES DANS CETTE NOTICE.

Possibilité de réactions allergiques,

En raison de la présence de maltitol, risque de troubles digestifs et de diarrhée.

5. COMMENT CONSERVER STREPSILS CITRON SANS SUCRE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

Conditions de conservation

Conservez ce médicament à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

Que contient Strepsils citron sans sucre ?

Les substances actives sont

Amylnmétacrésol.....0,6 mg

Alcool 2,4-dichlorobenzylrique.....1,2 mg

Pour une pastille

Les autres composants sont :

Arôme citron PHL-135077, jaune de quinoléine (E104), saccharine sodique, acide tartrique, maltitol liquide, isomalt

Qu'est ce que Strepsils citron sans sucre et contenu de l'emballage extérieur ?

Boîte de 24 pastilles à sucer



Titulaire /Exploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

15, RUE AMPÈRE

91748 MASSY CEDEX

Fabricant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD

THANE ROAD, NOTTINGHAM

NOTTINGHAMSHIRE NG90 2DB (GB)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 13 mai 2008

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).